"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Ligeramente peligroso por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evite contacto con la piel, ojos y evite respirar la aspersión.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo, mezcla y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reutilizar el envase para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Estrobilurinas: oxaminoacetato.
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a**:
  CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó
  ESSALUD Teléfono: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para los organismos acuáticos. No contaminar las fuentes de agua con los desechos o envases vacíos, restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

COD.

DEFENDER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Kresoxim methyl ..... 500 g/kg
Aditivos ..... 500 g/kg

Reg. PQUA Nº 209 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Av. 28 de Julio Nº 150 piso 7 - Miraflores.
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS Co., Ltd.
4-A, Building B, Yuanyang Building,
Jiaxing Zhejiang Province China.

DROKASA PERU

ENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**
Calle Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 600 g

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

®Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
DEFENDER, presenta efectos curativos y preventivos. El efecto curativo se manifiesta cuando el tratamiento es realizado 24 - 48 horas después de la infección. Es usado para prevenir y controlar el ataque de *Leveillula taurica* en el cultivo de Páprika.

DEFENDER, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil		
Páprika	"Oidiosis"	*Leveillula taurica*	0.2 - 0.3	0.1 - 0.15	7	1.0
Espárrago	"Mancha del peral"	*Stemphylium vesicarium*	0.2 - 0.25	0.1 - 0.125	21	0.05
Alcachofa	"Oidiosis"	*Leveillula taurica*	-	0.1 - 0.12	ND	0.05
Holantao	"Oidiosis"	*Erysiphe betae*	-	0.06 - 0.08	ND	0.05
Vid	"Oidiosis"	*Erysiphe necator*	-	0.05 - 0.06	35	1.0
Melocotonero	"Oidium"	*Sphaeroteca pannosa var. persicae*	-	0.06 - 0.08	1	0.05
Manzano	"Oidiosis"	*Podosphaera leucotricha*	-	0.04 - 0.06	35	0.2
Cebolla	"Mancha del peral"	*Stemphylium vesicarium*	0.25 - 0.3	-	7	0.05
Mandarina	"Podredumbre gris"	*Botrytis cinerea*	-	0.03 - 0.045	14	0.05

L.M.R. = Límite máximo de residuos **P.C.** = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
DEFENDER, es utilizado cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o después de la primera manifestación de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación / campaña.

PERIODO DE REINGRESO 24 horas, una vez secado el depósito aplicado.

COMPATIBILIDAD DEFENDER, se puede combinar con fungicidas, insecticidas y biorreguladores.

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO